CIRURGIA PARENDODÔNTICA COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA O TRATAMENTO DE LESÃO PERIAPICAL PERSISTENTE EM INCISIVOS SUPERIORES: RELATO DE CASO

Helen Gabriele Guarino Feijão (helengabrielex@gmail.com)

Ana Aline da Penha Parente (ap0879105@gmail.com)

Samilly de Fatima Aragão Fernandes (aragaosamilly21@gmail.com)

Vilker Ferreira Gomes (vilkergom@gmail.com)

Maria Larissa Pontes Magalhães (maria.magalhaes@uninta.edu.br)

INTRODUÇÃO: O tratamento endodôntico primário é realizado com o objetivo de controlar alterações pulpares e periapicais, favorecendo a manutenção do elemento dentário. Em situações de insucesso ou persistência da condição patológica, o retratamento endodôntico constitui uma alternativa para restabelecer o controle da infecção. Quando essa abordagem apresenta limitações ou não é suficiente para promover a resolução do quadro, a cirurgia parendodôntica pode ser indicada como procedimento complementar, permitindo a intervenção direta na região apical e a remoção dos tecidos comprometidos. **OBJETIVO:** Relatar um caso clínico de cirurgia parendodôntica associada ao retratamento endodôntico no tratamento de extensa lesão periapical persistente. **RELATO DE CASO CLÍNICO:** Paciente apresentou extensa lesão periapical envolvendo os elementos 11, 12, 21 e 22, previamente tratados endodonticamente. Após avaliação clínico-radiográfica, foi indicado retratamento endodôntico associado à cirurgia parendodôntica. Inicialmente, os elementos 11 e 21 foram desobturados e reinstrumentados até lima K #50, com comprimento de trabalho de 23 mm, enquanto o elemento 12 foi instrumentado até lima K #40, seguido de medicação intracanal e selamento provisório. Posteriormente, realizou-se cirurgia parendodôntica para enucleação da lesão cística, com apicectomia dos elementos 12, 21 e 22 e ressecção de aproximadamente 2 mm das porções apicais. Foram realizados selamentos retrógrados com MTA Repair e obturações com materiais endodônticos apropriados. O acompanhamento clínico e radiográfico demonstrou evolução favorável, com ausência de sinais e sintomas e indicativos de reparação dos tecidos periapicais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A associação entre retratamento endodôntico e cirurgia parendodôntica apresentou evolução favorável no manejo da lesão periapical persistente, contribuindo para o controle da infecção, reparação dos tecidos periapicais e preservação dos elementos dentários.

Palavras-chave: Endodontia; Cirurgia Parendodôntica; Lesão Periapical; Apicectomia; Prognóstico.